

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРИ

В зоне риска



дети от 1 до 4 лет



взрослые до 40 лет, не привитые и не переболевшие

Путь передачи




воздушно-капельным путем (при кашле, чихании)

Возбудитель гибнет



Под действием солнечного света



Под действием ультрафиолетовых лучей



При проветривании помещения

СИМПТОМЫ



Повышение температуры



Насморк



Сухой навязчивый кашель



Конъюнктивит



Покраснение и отечность слизистой оболочки глотки



Увеличение шейных лимфатических узлов




Вялость, плохой сон



Пятнисто-папулезная розовая сыпь на коже

+ ЛЕЧЕНИЕ



Постельный режим



Проветривание и уборка комнаты



Гигиенические ванны



Промывание глаз тёплой кипяченой водой или 2%-м раствором соды



Обильное питье



Витаминизированное питание при нормализации температуры



Детям — молочно-растительная диета

✓ ПРОФИЛАКТИКА



ВАКЦИНАЦИЯ



Использование противомикробных и противовирусных препаратов

Вакцинация не рекомендуется

- при беременности
- в пределах 3 месяцев до зачатия



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРИ



заражение происходит при передаче патогена от носителя к здоровому человеку **воздушнокапельным** реже контактным путем



болеют люди разного возраста, но чаще **дети 4-5 лет**

СИМПТОМЫ



повышение температуры



насморк



сухой навязчивый кашель



конъюнктивит



покраснение и отечность слизистой оболочки глотки



увеличение шейных лимфатических узлов



вялость, плохой сон



пятнисто-папулезная розовая сыпь на коже

ЛЕЧЕНИЕ



постельный режим



обильное питье



проветривание и уборка комнаты



витаминизированное питание при нормализации температуры



гигиенические ванны



детям - молочно-растительная диета




промывание глаз теплой кипяченой водой или 2% раствором соды

Корь: симптомы и профилактика

Является одной из самых заразных болезней, известных на сегодня


СИМПТОМЫ КОРИ

От 7 до 14 дней длится инкубационный период, т.е. время от заражения до появления первых симптомов



Если человек, ранее корью не болевший и не привитый, будет контактировать с больным корью, вероятность заболеть практически 100%

Важно помнить, что болезнь начинается не с появления сыпи, а с симптомов простуды:




- 1 Температура 38-40°C
- 2 Резкая слабость
- 3 Отсутствие аппетита
- 4 Сухой кашель
- 5 Насморк
- 6 Позже появляется конъюнктивит

Корью чаще болеют дети

Через 2-4 дня:

На слизистой оболочке щек (напротив коренных зубов) возникают мелкие беловатые высыпания



На 6-8-й день:

Максимальное высыпание, температура может подниматься до

40,5°C

На 3-5-й день:

Кожа покрывается сыпью в виде ярких пятен, которые могут сливаться между собой. Сначала сыпь появляется за ушами и на лбу, затем быстро распространяется ниже на лицо, шею, тело и конечности



Надежным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ



- Путь передачи инфекции — воздушно-капельный
- Источник инфекции — больной корью, который заразен для окружающих с последних двух дней инкубационного периода до 4-го дня высыпаний
- С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным

ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВЫ



- При малейшем подозрении на корь следует незамедлительно обратиться к врачу
- Не занимайтесь самолечением: при первых признаках заболевания обратитесь к врачу!

ЧТО СДЕЛАЕТ ВРАЧ



- Лечение неосложненной кори: постельный режим, обильное питье, жаропонижающие, средства от насморка и боли в горле, отхаркивающие препараты, витамины
- В случае развития осложнений кори дальнейшее лечение проводят в стационаре

ОСЛОЖНЕНИЯ

Осложнения развиваются чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет. Наиболее распространенными являются воспаление среднего уха (отит), слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит